

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**  
**28<sup>η</sup> Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα**

**"Ο Αρχιμήδης"**

**ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011**

**Ενδεικτικές Λύσεις θεμάτων μικρών τάξεων**

**ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1**


Έστω τρίγωνο  $AB\Gamma$  με  $\hat{B}\hat{A}\hat{\Gamma} = 120^\circ$ . Αν  $\Delta$  είναι το μέσον της πλευράς  $B\Gamma$ , δίνεται ότι η ευθεία  $A\Delta$  είναι κάθετη προς την πλευρά  $AB$  και τέμνει τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου  $AB\Gamma$  στο σημείο  $E$ . Οι ευθείες  $BA$  και  $E\Gamma$  τέμνονται στο  $Z$ . Να αποδείξετε ότι:

(α)  $Z\Delta \perp BE$ ,      (β)  $Z\Delta = B\Gamma$ .

**Λύση**

(α) Επειδή είναι  $\hat{B}\hat{A}\hat{E} = 90^\circ$  η  $BE$  είναι διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου  $AB\Gamma$ . Επομένως θα είναι και  $\hat{B}\hat{\Gamma}\hat{E} = 90^\circ$ . Έτσι στο τρίγωνο  $ZBE$  τα ευθύγραμμα τμήματα  $EA$  και  $B\Gamma$  είναι ύψη του τριγώνου που τέμνονται στο σημείο  $\Delta$ .

Επομένως η ευθεία  $Z\Delta$  είναι η ευθεία του τρίτου ύψους του τριγώνου  $ZBE$ , δηλαδή είναι  $Z\Delta \perp BE$ .



Σχήμα 1

Διαφορετικά, θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι:  $\hat{Z}\hat{B}\hat{H} = 90^\circ$ . Πράγματι, έχουμε

$$\hat{Z}\hat{B}\hat{H} = 180^\circ - (\hat{H}\hat{B}\hat{Z} + \hat{B}\hat{Z}\hat{H}) \quad (1)$$

Όμως έχουμε

$$\hat{H}\hat{B}\hat{Z} = \hat{E}\hat{B}\hat{\Gamma} + \hat{\Gamma}\hat{B}\hat{A} = \hat{E}\hat{A}\hat{\Gamma} + \hat{\Gamma}\hat{B}\hat{A} = 120^\circ - 90^\circ + \hat{\Gamma}\hat{B}\hat{A} = 30^\circ + \hat{B}. \quad (2)$$

Επίσης από το εγγράψιμο τετράπλευρο  $A\Delta\Gamma Z$  (γιατί  $\widehat{AZ} = \widehat{\Gamma Z} = 90^\circ$ ) έχουμε ότι:

$$\widehat{BZH} = \widehat{AZ\Delta} = \widehat{\Gamma} \quad (3)$$

Λόγω των (2) και (3) η σχέση (1) γίνεται:

$$\widehat{BZH} = 180^\circ - (30^\circ + \widehat{B} + \widehat{\Gamma}) = 150^\circ - (\widehat{B} + \widehat{\Gamma}) = 150^\circ - (180^\circ - 120^\circ) = 90^\circ.$$

(β) Παρατηρούμε ότι το τετράπλευρο  $A\Delta\Gamma Z$  είναι εγγράψιμο, αφού  $\widehat{AZ} + \widehat{\Gamma Z} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ . Άρα θα έχουμε  $\widehat{\Delta Z\Gamma} = \widehat{\Delta\Gamma Z} = \widehat{B\Gamma\Delta} - \widehat{B\Delta Z} = 120^\circ - 90^\circ = 30^\circ$ .

Επομένως στο ορθογώνιο τρίγωνο  $\Delta\Gamma Z$  η υποτείνουσα  $Z\Delta$  θα είναι διπλάσια της κάθετης πλευράς  $\Delta\Gamma$ , δηλαδή  $Z\Delta = 2 \cdot \Delta\Gamma = B\Gamma$ , αφού  $\Delta$  μέσο της πλευράς  $B\Gamma$ .

## ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Θεωρούμε το σύνολο των τετραψήφιων θετικών ακέραιων αριθμών  $x = \overline{\alpha\beta\gamma\delta}$  των οποίων όλα τα ψηφία είναι διαφορετικά από το μηδέν και διαφορετικά μεταξύ τους. Θεωρούμε επίσης τους αριθμούς  $y = \overline{\delta\gamma\beta\alpha}$  και υποθέτουμε  $x > y$ . Βρείτε τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή της διαφοράς  $x - y$ , καθώς και τους αντίστοιχους τετραψήφιους ακέραιους  $x, y$  για τις οποίες λαμβάνονται αυτές οι τιμές.

### Λύση

Θεωρούμε τη δεκαδική αναπαράσταση των αριθμών :

$$\begin{aligned} x - y &= 1000\alpha + 100\beta + 10\gamma + \delta - 1000\delta - 100\gamma - 10\beta - \alpha \\ &= 1000(\alpha - \delta) + 100(\beta - \gamma) + 10(\gamma - \beta) + \delta - \alpha \\ &= 999(\alpha - \delta) + 90(\beta - \gamma) \\ &= 9(111(\alpha - \delta) + 10(\beta - \gamma)). \end{aligned}$$

Αρκεί να προσδιορίσουμε τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της παράστασης:

$$A = 111(\alpha - \delta) + 10(\beta - \gamma).$$

Οι αριθμοί  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  είναι θετικοί μονοψήφιοι ακέραιοι (διαφορετικοί μεταξύ τους). Εφόσον  $x > y$ , θα ισχύει  $\alpha > \delta$ .

Η παράσταση  $A$  γίνεται μέγιστη, όταν οι αριθμοί  $\alpha - \delta$  και  $\beta - \gamma$  γίνουν μέγιστοι και επί πλέον  $\alpha - \delta > \beta - \gamma$ . Η διαφορά  $\alpha - \delta$  γίνεται μέγιστη όταν  $\alpha = 9$  και  $\delta = 1$ . Η διαφορά  $\beta - \gamma$  γίνεται μέγιστη όταν  $\beta = 8$  και  $\gamma = 2$ .

Άρα  $x = 9821$  και  $y = 1289$  είναι οι ζητούμενοι ακέραιοι οι οποίοι δημιουργούν τη μεγαλύτερη διαφορά  $x - y = 9821 - 1289 = 8532$ .

Η παράσταση  $A$  γίνεται ελάχιστη, όταν οι αριθμοί  $\alpha - \delta$  και  $\beta - \gamma$  γίνουν ελάχιστοι.

Η ελάχιστη τιμή της διαφοράς  $\alpha - \delta$  είναι το 1. Άρα οι δυνατές τιμές του ζεύγους  $(\alpha, \delta)$  είναι:

$$(9, 8), (8, 7), (7, 6), (6, 5), (5, 4), (4, 3), (3, 2) \text{ και } (2, 1).$$

Για όλες τις παραπάνω δυνατές τιμές του ζεύγους  $(\alpha, \delta)$ , η τιμή της παράστασης  $A$  γίνεται:

$$A = 111 + 10(\beta - \gamma).$$

Η ελάχιστη τιμή τώρα της διαφοράς  $\beta - \gamma$  είναι το  $-8$  που δημιουργείται για  $\beta = 1$  και  $\gamma = 9$ .

Απορρίπτοντας τέλος τα ζεύγη (9,8) και (2,1) (διότι τα ψηφία του τετραψήφιου αριθμού είναι διαφορετικά μεταξύ τους), καταλήγουμε στον παρακάτω πίνακα δυνατών τιμών των αριθμών  $x, y$  καθώς και την ελάχιστη διαφορά.

3192	2913	279
4193	3914	279
5194	4915	279
6195	5916	279
7196	6917	279
8197	7918	279

### ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Αν ο αριθμός  $3\nu+1$ , όπου  $\nu$  ακέραιος, είναι πολλαπλάσιο του 7, να βρείτε τα δυνατά υπόλοιπα της διαίρεσης:

(α) του  $\nu$  με το 7,

(β) του  $\nu^m$  με το 7, για τις διάφορες τιμές του θετικού ακέραιου  $m, m > 1$ .

#### Λύση

(α) Έστω  $3\nu+1=7\kappa$ , όπου  $\nu, \kappa$  ακέραιοι. Ο ακέραιος  $\nu$  έχει τη μορφή  $\nu=7\rho+\nu$ , όπου  $\nu \in \{0,1,2,3,4,5,6\}$  και  $\rho$  ακέραιος. Τότε έχουμε:

$$3(7\rho+\nu)+1=7\kappa \Leftrightarrow 21\rho+3\nu+1=7\kappa \Leftrightarrow 3\nu+1=\text{πολλαπλάσιο του } 7,$$

οπότε η μόνη δυνατή τιμή για το  $\nu$  είναι το 2. Έτσι έχουμε  $\nu=7\rho+2$ , όπου  $\rho$  ακέραιος, οπότε το μοναδικό δυνατό υπόλοιπο της διαίρεσης του  $\nu$  με το 7 είναι το 2.

(β) Έχουμε

$$\nu^m = (7\rho+2)^m = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} (7\rho)^{m-i} 2^i = \text{πολ.}7 + 2^m.$$

Επομένως, αρκεί να βρούμε τα δυνατά υπόλοιπα της διαίρεσης του  $2^m$  με το 7.

Αν υποθέσουμε ότι  $m=3\sigma+\nu$ , όπου  $\nu \in \{0,1,2\}$ , τότε λαμβάνουμε:

$$2^m = 2^{3\sigma+\nu} = 8^\sigma \cdot 2^\nu = (7+1)^\sigma \cdot 2^\nu = (\text{πολ.}7+1) \cdot 2^\nu = \text{πολ.}7 + 2^\nu,$$

όπου  $\nu \in \{0,1,2\}$ . Άρα τα δυνατά υπόλοιπα της διαίρεσης του  $\nu^m$  με το 7, για τις διάφορες τιμές του θετικού ακέραιου  $m, m > 1$  είναι τα  $2^0 = 1, 2^1 = 2$  και  $2^2 = 4$ .

### ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Αν  $x, y, z$  είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί με άθροισμα 12, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} + 3 \geq \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

Πότε ισχύει η ισότητα;

#### Λύση

Επειδή οι θετικοί πραγματικοί αριθμοί  $x, y, z$  έχουν άθροισμα 12, αρκεί να αποδείξουμε την ανισότητα

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} + \frac{x+y+z}{4} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}. \quad (1)$$

Επειδή οι πραγματικοί αριθμοί  $x, y, z$  είναι θετικοί, από την ανισότητα αριθμητικού – γεωμετρικού μέσου έχουμε

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{4} \geq 2\sqrt{\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{4}} = \sqrt{x}, \quad (2)$$

$$\frac{y}{z} + \frac{z}{4} \geq 2\sqrt{\frac{y}{z} \cdot \frac{z}{4}} = \sqrt{y}, \quad (3)$$

$$\frac{z}{x} + \frac{x}{4} \geq 2\sqrt{\frac{z}{x} \cdot \frac{x}{4}} = \sqrt{z}. \quad (4)$$

Με πρόσθεση κατά μέλη των (2), (3) και (4) προκύπτει η ανισότητα (1).

Η ισότητα ισχύει, όταν οι ανισότητες (2), (3) και (4) αληθεύουν και οι τρεις ως ισότητες., δηλαδή όταν

$$\frac{x}{y} = \frac{y}{4}, \frac{y}{z} = \frac{z}{4}, \frac{z}{x} = \frac{x}{4} \Leftrightarrow x = \frac{y^2}{4}, y = \frac{z^2}{4}, z = \frac{x^2}{4} \Leftrightarrow x = \frac{y^2}{4}, y = \frac{z^2}{4}, z = \frac{1}{4} \left( \frac{y^2}{4} \right)^2 = \frac{y^4}{4^3}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{y^2}{4}, y = \frac{z^2}{4}, z = \frac{1}{4^3} \left( \frac{z^2}{4} \right)^4$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{y^2}{4}, y = \frac{z^2}{4}, z = \frac{1}{4^7} z^8$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{y^2}{4}, y = \frac{z^2}{4}, z^7 = 4^7 \Leftrightarrow x = y = z = 4.$$

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΜΕ**  
**28<sup>η</sup> Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα**  
**"Ο Αρχιμήδης"**  
**ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011**  
**Ενδεικτικές Λύσεις θεμάτων μεγάλων τάξεων**

**ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1**

Να λύσετε στους ακέραιους την εξίσωση

$$x^3 y^2 (2y - x) = x^2 y^4 - 36.$$

**Λύση**

Μετά τις πράξεις διαπιστώνουμε ότι η δεδομένη εξίσωση είναι ισοδύναμη με την εξίσωση

$$\begin{aligned} x^2 y^2 (x - y)^2 - 6^2 &= 0, \quad x, y \in \mathbb{Z}, \\ \Leftrightarrow [xy(x - y) - 6] \cdot [xy(x - y) + 6] &= 0, \quad x, y \in \mathbb{Z}, \\ \Leftrightarrow xy(x - y) = 6, \quad x, y \in \mathbb{Z}, \quad \text{ή} \quad xy(x - y) &= -6, \quad x, y \in \mathbb{Z}. \\ \Leftrightarrow xy(x - y) = 6, \quad x, y \in \mathbb{Z}, \quad (1) \quad \text{ή} \quad xy(y - x) &= 6, \quad x, y \in \mathbb{Z}. \quad (2) \end{aligned}$$

Από τη μορφή των (1) και (2) προκύπτει ότι, αν  $(x_0, y_0)$  είναι λύση της (1), τότε το ζευγάρι  $(y_0, x_0)$  είναι λύση της (2) και αντιστρόφως. Επομένως, αρκεί να λύσουμε μόνον την εξίσωση (1). Επειδή  $x, y \in \mathbb{Z}$ , η εξίσωση (1) είναι ισοδύναμη με :

$$\begin{aligned} \{xy = 6, x - y = 1\} (\Sigma_1) \quad \text{ή} \quad \{xy = -6, x - y = -1\} (\Sigma_2) \\ \text{ή} \{xy = 3, x - y = 2\} (\Sigma_3) \quad \text{ή} \quad \{xy = -3, x - y = -2\} (\Sigma_4) \\ \text{ή} \{xy = 1, x - y = 6\} (\Sigma_5) \quad \text{ή} \quad \{xy = -1, x - y = -6\} (\Sigma_6) \\ \text{ή} \{xy = 2, x - y = 3\} (\Sigma_7) \quad \text{ή} \quad \{xy = -2, x - y = -3\} (\Sigma_8). \end{aligned}$$

Από τα 8 συστήματα μόνον τα  $(\Sigma_1)$ ,  $(\Sigma_3)$ ,  $(\Sigma_8)$  δίνουν τις ακέραιες λύσεις:

$$\begin{aligned} (x, y) = (3, 2), (x, y) = (-2, -3), (x, y) = (3, 1), \\ (x, y) = (-1, -3), (x, y) = (-2, 1) \text{ και } (x, y) = (-1, 2). \end{aligned}$$

Σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω, η εξίσωση (2) έχει στους ακέραιους τις λύσεις


$$\begin{aligned} (x, y) = (2, 3), (x, y) = (-3, -2), (x, y) = (1, 3), \\ (x, y) = (-3, -1), (x, y) = (1, -2) \text{ και } (x, y) = (2, -1). \end{aligned}$$

**ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2**

Στο καρτεσιανό επίπεδο  $Oxy$  θεωρούμε τα σημεία  $A_1(40,1)$ ,  $A_2(40,2)$ , ...,  $A_{40}(40,40)$  καθώς και τα ευθύγραμμα τμήματα  $OA_1, OA_2, \dots, OA_{40}$ . Ένα σημείο του καρτεσιανού επιπέδου  $Oxy$  θα το ονομάζουμε "καλό", όταν οι συντεταγμένες του είναι ακέραιοι αριθμοί και βρίσκεται στο εσωτερικό (δηλαδή δεν ταυτίζεται με κάποιο από τα άκρα του) ενός ευθυγράμμου τμήματος  $OA_i$   $i = 1, 2, 3, \dots, 40$ . Επίσης, ένα από τα ευθύγραμμα τμήματα  $OA_1, OA_2, \dots, OA_{40}$ , θα το ονομάζουμε "καλό", όταν περιέχει ένα τουλάχιστον "καλό" σημείο. Να υπολογισθεί το πλήθος των "καλών" σημείων και το πλήθος των "καλών" ευθυγράμμων τμημάτων.

**Λύση.**

Στη λύση που ακολουθεί, θα συμβολίζουμε με  $MK\Delta(k,l)$ , το μέγιστο κοινό διαιρέτη των ακεραίων αριθμών  $k,l$ .



Σχήμα 1

Ένα σημείο  $M(k,l)$  θα ανήκει στο εσωτερικό του ευθυγράμμου τμήματος  $OA_i$ , αν και μόνο αν, τα διανύσματα  $\overrightarrow{OM}$  και  $\overrightarrow{OA_i}$  έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης (με  $k,l$  ακέραιους αριθμούς και  $0 < k \leq 40$ ), δηλαδή πρέπει να ισχύει  $\frac{i}{40} = \frac{l}{k}$  (με  $k,l$  ακέραιους αριθμούς και  $0 < k \leq 40$ ).

Για να είναι τώρα το ευθύγραμμο τμήμα  $OA_i$  “καλό”, θα πρέπει το κλάσμα  $\frac{i}{40}$  να μην είναι ανάγωγο (ώστε να δημιουργούνται ισοδύναμα με το  $\frac{i}{40}$  κλάσματα με ακέραιους όρους που θα δημιουργούν το συντελεστή διεύθυνσης  $\frac{l}{k}$  και τις αντίστοιχες συντεταγμένες του “καλού” σημείου  $M(k,l)$ ).

Επομένως, για να υπάρχει “καλό” σημείο στο ευθύγραμμο τμήμα  $OA_i$  (ώστε να χαρακτηριστεί και το ίδιο ως “καλό”) θα πρέπει  $MK\Delta(40,i) > 1$ . Αν τώρα  $MK\Delta(40,i) > 1$ , τότε θα υπάρχουν  $MK\Delta(40,i) - 1$  “καλά” σημεία στο ευθύγραμμο τμήμα  $OA_i$ . Στο σημείο  $A_2(40,2)$  αντιστοιχεί το “καλό” ευθύγραμμο τμήμα  $OA_2$ , στο οποίο ανήκει το “καλό” σημείο  $(20,1)$ . Στο σημείο  $A_4(40,4)$  αντιστοιχεί το “καλό” ευθύγραμμο τμήμα  $OA_4$ , στο οποίο ανήκουν τα “καλά” σημεία  $(10,1)$ ,  $(20,2)$ ,  $(30,3)$ . Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε τον πίνακα:

$A_2(40,2)$	$MK\Delta(40,2)=2$	1	$A_{40}(40,40)$	$MK\Delta(40,40)=40$	39
$A_4(40,4)$	$MK\Delta(40,4)=4$	3	$A_{38}(40,38)$	$MK\Delta(40,38)=2$	1
$A_5(40,5)$	$MK\Delta(40,5)=5$	4	$A_{36}(40,36)$	$MK\Delta(40,36)=4$	3
$A_6(40,6)$	$MK\Delta(40,6)=2$	1	$A_{35}(40,35)$	$MK\Delta(40,35)=5$	4
$A_8(40,8)$	$MK\Delta(40,8)=8$	7	$A_{34}(40,34)$	$MK\Delta(40,34)=2$	1
$A_{10}(40,10)$	$MK\Delta(40,10)=10$	9	$A_{32}(40,32)$	$MK\Delta(40,32)=8$	7
$A_{12}(40,12)$	$MK\Delta(40,12)=4$	3	$A_{30}(40,30)$	$MK\Delta(40,30)=10$	9
$A_{14}(40,14)$	$MK\Delta(40,14)=2$	1	$A_{28}(40,28)$	$MK\Delta(40,28)=4$	3
$A_{15}(40,15)$	$MK\Delta(40,15)=5$	4	$A_{26}(40,26)$	$MK\Delta(40,26)=2$	1
$A_{16}(40,16)$	$MK\Delta(40,16)=8$	7	$A_{25}(40,25)$	$MK\Delta(40,25)=5$	4

A18(40,18)	MKΔ(40,18)=2	1	A24(40,24)	MKΔ(40,24)=8	7
A20(40,20)	MKΔ(40,20)=20	19	A22(40,22)	MKΔ(40,22)=2	1
		<b>60</b>			<b>80</b>

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι το πλήθος των “καλών” τμημάτων είναι 24 και το πλήθος των καλών σημείων 140.

### Παρατηρήσεις

1. Ο παραπάνω πίνακας έχει ευρεία ανάπτυξη για διδακτικούς λόγους.
2. Ο υπολογισμός του πίνακα διευκολύνεται σημαντικά με τη χρησιμοποίηση των ιδιοτήτων του μέγιστου κοινού διαιρέτη:

$$\text{MK}\Delta(k, l) = \text{MK}\Delta(l, k) = \text{MK}\Delta(l - k, k) = \text{MK}\Delta(|l - k|, |k|).$$

3. Το πλήθος των “καλών” ευθυγράμμων τμημάτων μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια της συνάρτησης  $\phi$  του Euler. Είναι γνωστό ότι  $n - \phi(n)$  παριστά το πλήθος των θετικών ακεραίων που είναι μικρότεροι ή ίσοι με τον  $n$  και δεν είναι πρώτοι προς αυτόν. Επειδή όμως  $40 = 5 \cdot 2^3$ , έχουμε:

$$\phi(40) = 40 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40 \frac{1}{2} \frac{4}{5} = 16.$$

Άρα το πλήθος των “καλών” ευθυγράμμων τμημάτων είναι  $40 - \phi(40) = 24$ .

### ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Αν  $a, b, c$  είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί με άθροισμα 6, να προσδιορίσετε τη μέγιστη τιμή της παράστασης:

$$S = \sqrt[3]{a^2 + 2bc} + \sqrt[3]{b^2 + 2ca} + \sqrt[3]{c^2 + 2ab}.$$

#### Λύση.

Χρησιμοποιούμε την ανισότητα αριθμητικού – γεωμετρικού μέσου ως εξής:

$$\sqrt[3]{a^2 + 2bc} = \frac{1}{\sqrt[3]{12^2}} \sqrt[3]{(a^2 + 2bc) \cdot 12 \cdot 12} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{12^2}} \cdot \frac{a^2 + 2bc + 12 + 12}{3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{12^2}} (a^2 + 2bc + 24),$$

$$\sqrt[3]{b^2 + 2ca} = \frac{1}{\sqrt[3]{12^2}} \sqrt[3]{(b^2 + 2ca) \cdot 12 \cdot 12} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{12^2}} \cdot \frac{b^2 + 2ca + 12 + 12}{3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{12^2}} (b^2 + 2ca + 24),$$

$$\sqrt[3]{c^2 + 2ab} = \frac{1}{\sqrt[3]{12^2}} \sqrt[3]{(c^2 + 2ab) \cdot 12 \cdot 12} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{12^2}} \cdot \frac{c^2 + 2ab + 12 + 12}{3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{12^2}} (c^2 + 2ab + 24),$$

από τις οποίες με πρόσθεση κατά μέλη λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} S = \sqrt[3]{a^2 + 2bc} + \sqrt[3]{b^2 + 2ca} + \sqrt[3]{c^2 + 2ab} &\leq \frac{1}{3\sqrt[3]{12^2}} (a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca + 72) \\ &= \frac{1}{3\sqrt[3]{12^2}} [(a+b+c)^2 + 72] = \frac{36}{\sqrt[3]{12^2}} = \frac{18}{\sqrt[3]{18}} = 3\sqrt[3]{12}. \end{aligned}$$

Η ισότητα ισχύει όταν

$$\begin{aligned}
& a^2 + 2bc = 12, b^2 + 2ca = 12, c^2 + 2ab = 12 \\
& \Leftrightarrow (a-b)(a+b-2c) = 0, (b-c)(b+c-2a) = 0, c^2 + 2ab = 12 \\
& \Leftrightarrow (a-b)(6-3c) = 0, (b-c)(6-3a) = 0, c^2 + 2ab = 12 \\
& \Leftrightarrow a = b = c = 2.
\end{aligned}$$

Επομένως η μέγιστη τιμή της παράστασης είναι  $3\sqrt[3]{12}$  και λαμβάνεται όταν είναι  $a = b = c = 2$ .

### Παρατήρηση

1. Η επιλογή του αριθμού 12 ως δεύτερου και τρίτου όρου για την εφαρμογή της ανισότητας αριθμητικού – γεωμετρικού μέσου οφείλεται στο ότι μόνον για αυτόν είναι δυνατόν να αληθεύει η ισότητα και στις τρεις επιμέρους ανισότητες. Αυτό είναι αναγκαίο για είναι δυνατόν η παράσταση να πάρει την τιμή που εμφανίζεται ως ένα πάνω φράγμα της. Για παράδειγμα, αν είχαμε χρησιμοποιήσει τις ανισότητες

$$\begin{aligned}
\sqrt[3]{a^2 + 2bc} &= \sqrt[3]{(a^2 + 2bc) \cdot 1 \cdot 1} \leq \frac{a^2 + 2bc + 2}{3}, \\
\sqrt[3]{b^2 + 2ca} &= \sqrt[3]{(b^2 + 2ca) \cdot 1 \cdot 1} \leq \frac{b^2 + 2ca + 2}{3}, \\
\sqrt[3]{c^2 + 2ab} &= \sqrt[3]{(c^2 + 2ab) \cdot 1 \cdot 1} \leq \frac{c^2 + 2ab + 2}{3},
\end{aligned}$$

τότε με πρόσθεση κατά μέλη θα βρίσκαμε

$$\begin{aligned}
S &= \sqrt[3]{a^2 + 2bc} + \sqrt[3]{b^2 + 2ca} + \sqrt[3]{c^2 + 2ab} \leq \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca + 6}{3} \\
&= \frac{(a+b+c)^2 + 6}{3} = \frac{42}{3} = 14.
\end{aligned}$$

Η ισότητα στην τελευταία σχέση δεν μπορεί να αληθεύει, όπως προκύπτει από το σύστημα

$$\begin{aligned}
& a^2 + 2bc = 1, b^2 + 2ca = 1, c^2 + 2ab = 1 \\
& \Rightarrow (a+b+c)^2 = 3, \text{ άτοπο.}
\end{aligned}$$

2. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον μετασχηματισμό

$$x = \sqrt[3]{a^2 + 2bc}, y = \sqrt[3]{b^2 + 2ca}, z = \sqrt[3]{c^2 + 2ab},$$

μέσω του οποίου η συνάρτηση γίνεται  $S(x, y, z) = x + y + z$ , της οποίας ζητάμε τη μέγιστη τιμή υπό τη συνθήκη  $x^3 + y^3 + z^3 = (a+b+c)^2 = 36$ . Στη συνέχεια θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών του **Lagrange**, χωρίς σοβαρό πρόβλημα στις πράξεις. Επίσης θα μπορούσε κάποιος να εργαστεί χρησιμοποιώντας και άλλες κλασικές ανισότητες, όπως η ανισότητα του **Holder** ή την ανισότητα των δυνάμεων.

### ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4


Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο  $ABC$  ( με  $AB < AC$  ), εγγεγραμμένο σε κύκλο  $c(O, R)$  ( με κέντρο το σημείο  $O$  και ακτίνα  $R$  ). Η προέκταση του ύψους  $AD$  τέμνει τον περιγεγραμμένο κύκλο στο σημείο  $E$  και η μεσοκάθετη ( $\mu$ ) της πλευράς  $AB$  τέμνει την  $AD$  στο σημείο  $L$ . Η  $BL$  τέμνει την  $AC$  στο σημείο  $M$  και τον περιγεγραμμένο κύκλο  $c(O, R)$  στο σημείο  $N$ . Τέλος η  $EN$  τέμνει τη μεσοκάθετη ( $\mu$ ) στο σημείο  $Z$ .



Να αποδείξετε ότι:  $MZ \perp BC \Leftrightarrow (CA = CB \text{ ή } Z \equiv O)$ , δηλαδή ότι “η  $MZ$  είναι κάθετη στην  $BC$ , αν, και μόνο αν, το τρίγωνο  $ABC$  είναι ισοσκελές με  $CA = CB$  ή το σημείο  $Z$  ταυτίζεται με το κέντρο  $O$  του περιγεγραμμένου κύκλου  $c(O, R)$ ”.

### Λύση

Επειδή το σημείο  $L$  ανήκει στη μεσοκάθετη του  $AB$ , θα ισχύει:  $\hat{A}_1 = \hat{B}_1 = \hat{\omega}$  και κατά συνέπεια  $AN = BE$ . Άρα το τετράπλευρο  $ABEN$  είναι ισοσκελές τραπέζιο με  $AB \parallel EN$ , οπότε η ευθεία  $(\mu)$  είναι μεσοκάθετος της  $EN$  και  $\hat{E}_1 = \hat{N}_1 = \hat{\omega}$ .




Σχήμα 2

**Έστω ότι το σημείο  $Z$  ταυτίζεται με το σημείο  $O$  (Σχήμα 2).**

Τότε η  $EN$  γίνεται διάμετρος του κύκλου, οπότε  $\hat{E}B\hat{N} = \hat{B}_2 + \hat{B}_3 = 90^\circ$ . Αν  $\hat{C} = \hat{\phi}$  τότε από το εγγεγραμμένο τετράπλευρο  $ABEC$  έχουμε:  $\hat{B}_2 = \hat{A}_2 = 90^\circ - \hat{\phi}$ .

Από τη τελευταία ισότητα (σε συνδυασμό με την ισότητα  $\hat{B}_2 + \hat{B}_3 = 90^\circ$ ) έχουμε:  $\hat{B}_3 = \hat{\phi}$ . Άρα το  $M$  ανήκει στη μεσοκάθετη του  $BC$  ( $MB = MC$ ). Το σημείο  $O$  ανήκει επίσης στη μεσοκάθετη του  $BC$  και επειδή ταυτίζεται με το σημείο  $Z$ , συμπεραίνουμε ότι η  $MZ$  είναι μεσοκάθετος της  $BC$ .

**Έστω ότι το τρίγωνο  $ABC$  είναι ισοσκελές ( $CA = CB$ ).** Τότε η μεσοκάθετος  $(\mu)$  της  $AB$  είναι ύψος του τριγώνου  $ABC$  (Σχήμα 2), δηλαδή το  $L$  είναι το ορθόκέντρο του τριγώνου  $ABC$  και κατά συνέπεια **το σημείο  $M$  είναι το μέσο του τμήματος  $LN$**  (η  $BM$  είναι ύψος και το σημείο  $N$  είναι το συμμετρικό του ορθοκέντρου  $L$  ως προς την  $AC$ ).



Σχήμα 3


Το σημείο  $Z$  είναι το μέσο του τμήματος  $EN$  (διότι η ευθεία  $(\mu)$  είναι μεσοκάθετος της  $EN$ ).

Άρα η  $MZ$  είναι παράλληλη με την  $AD$ .

Στη συνέχεια θα υποθέσουμε ότι η  $MZ$  είναι κάθετη στην  $BC$  και θα αποδείξουμε ότι το τρίγωνο  $ABC$  είναι ισοσκελές ( $CA=CB$ ) ή το σημείο  $Z$  ταυτίζεται με το κέντρο  $O$  του περιγεγραμμένου κύκλου (Σχήμα 4).

Έστω λοιπόν ότι η  $MZ$  είναι κάθετη στην  $BC$ . Τότε η  $MZ$  θα είναι παράλληλη με την  $AE$  ( $MZ \parallel AE$ ).

Αν  $T$  είναι η τομή της  $MZ$  με την  $AN$  τότε το  $T$  είναι το μέσο  $AN$  (διότι  $Z$  είναι το μέσο της  $NE$  και  $MZ \parallel AE$ ). Άρα τα τρίγωνα  $MTA$  και  $MTN$  έχουν το ίδιο εμβαδό ( $E_1 = (MTA) = (MTN) = E_2$ ).



Σχήμα 4

Από την παραλληλία  $MZ \parallel AE$ , προκύπτει η “μεταφορά” γωνιών στο τρίγωνο  $AMN$  στο οποίο η  $MT$  είναι διάμεσος. Σημειώνουμε ότι:

$B\hat{L}D = 2\hat{\omega}$  (διότι η  $B\hat{L}D$  είναι εξωτερική γωνία του ισοσκελούς τριγώνου  $LEN$ ).  
 $L\hat{M}Z = 2\hat{\omega}$  (διότι  $LD \parallel MZ$  οπότε  $B\hat{L}D = L\hat{M}Z = 2\hat{\omega}$ ).

Χρησιμοποιώντας τώρα το γνωστό τύπο  $E = \frac{1}{2}\beta\gamma\eta\mu A$  για το εμβαδό τριγώνου, έχουμε:

$$E_1 = \frac{1}{2}mn\eta\mu(90 - \varphi) = \frac{1}{2}mx\eta\mu(90 - 2\omega)$$

$$E_2 = \frac{1}{2}kn\eta\mu 2\omega = \frac{1}{2}kx\eta\mu\varphi$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις, έχουμε:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu\varphi}{\eta\mu 2\omega} = \frac{\sigma\upsilon\nu 2\omega}{\eta\mu\varphi} \Leftrightarrow \eta\mu 2\varphi = \eta\mu 4\omega.$$


Από τη τελευταία ισότητα ημιτόνων (και με δεδομένο ότι οι γωνίες  $\omega, \varphi$  είναι γωνίες τριγώνου) καταλήγουμε στις ισότητες:

$$2\varphi = 4\omega \Leftrightarrow \varphi = 2\omega \quad (A) \quad \text{ή} \quad 2\varphi = \pi - 4\omega \Leftrightarrow \varphi + 2\omega = \frac{\pi}{2} \quad (B).$$


Από την ισότητα (A) συμπεραίνουμε ότι το τρίγωνο  $MTN$  είναι ισοσκελές ( $TM = TN$ ) και κατά συνέπεια το τρίγωνο  $AMN$  είναι ορθογώνιο στο  $M$  ( $A\hat{M}N = 90^\circ$ ). Άρα η  $BM$  είναι ύψος του τριγώνου  $ABC$  και επομένως το  $L$  ορθόκεντρο, δηλαδή το τρίγωνο  $ABC$  είναι ισοσκελές ( $CA = CB$ ) διότι η μεσοκάθετος  $KZ$  είναι και ύψος.

Από την ισότητα (B) συμπεραίνουμε ότι το τρίγωνο  $MTN$  είναι ορθογώνιο στο  $T$ , δηλαδή η  $MT$  είναι μεσοκάθετος της  $AN$ . Άρα η  $MT$  θα διέρχεται από το  $O$  (οπότε  $Z \equiv O$ ).

### Παρατήρηση



Σχήμα 5



Σχήμα 6

Αν το τρίγωνο  $ABC$  είναι ισοσκελές με  $CA = CB$  και  $\hat{C} = \hat{\varphi} = 45^\circ$ , τότε τα τρίγωνα  $TMN$ ,  $TMA$  και  $AMN$  είναι ορθογώνια και ισοσκελή. Το τετράπλευρο  $ABCN$  είναι ισοσκελές τραπέζιο. Άρα η  $TM$  είναι μεσοκάθετη της  $BC$ .

Στη περίπτωση αυτή και το σημείο  $Z$  ταυτίζεται με το σημείο  $O$ , οπότε η διάζευξη των προτάσεων  $(CA = CB \quad \text{ή} \quad Z \equiv O)$  είναι εγκλειστική.