

# Άλγεβρα

## Γενικής Παιδείας

### Β' Λυκείου 2001

#### Ζήτημα 1ο

**A.1.** Έστω η πολυωνυμική εξίσωση  $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ , με ακέραιους συντελεστές. Αν ο ακέραιος  $\rho \neq 0$  είναι ρίζα της εξίσωσης, να αποδείξετε ότι ο  $\rho$  είναι διαιρέτης του σταθερού όρου  $a_0$ .

Μονάδες 6,5

**A.2.** Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Έστω πολυώνυμο  $P(x)$  και  $\rho$  ένας πραγματικός αριθμός. Αν το  $P(x)$  έχει παράγοντα το  $x-\rho$  και  $\pi(x)$  είναι το πηλίκο της διαίρεσης του  $P(x)$  με το  $x-\rho$ , τότε:

**α.**  $P(x) = (x - \rho) \pi(x) + 1$

**β.**  $\pi(x) = (x - \rho) P(x)$

**γ.** ο βαθμός του υπολοίπου της διαίρεσης του  $P(x)$  με το  $x-\rho$  είναι ίσος με μηδέν

**δ.**  $P(\rho) = 0$ .

Μονάδες 6

**B.1.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη **Σωστό** ή **Λάθος** δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

**α.** Η εξίσωση  $3x^3 - 5x + 6 = 0$  έχει ρίζα το 4 .

**β.** Η εξίσωση  $4x^4 + 5x^2 + 7x + 4 = 0$  έχει ρίζα το 2 .

**γ.** Η εξίσωση  $6x^6 - 3x^3 + 2x^2 - x + 2 = 0$  δεν έχει ρίζα το -3 .

Μονάδες 6

**B.2.** Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Το πολυώνυμο  $P(x) = (4x + 5)^{2004} + x^{2001}$  έχει παράγοντα το:

**α.**  $x + 1$       **β.**  $x - 1$       **γ.**  $x$       **δ.**  $x + \frac{5}{4}$

Μονάδες 6,5

#### Απάντηση:

**A.1.** Αν ο  $\rho \neq 0$  είναι ρίζα της εξίσωσης, τότε διαδοχικά έχουμε:

$$a_n \rho^n + a_{n-1} \rho^{n-1} + \dots + a_1 \rho + a_0 = 0 \Leftrightarrow$$

$$a_0 = -a_n \rho^n - a_{n-1} \rho^{n-1} - \dots - a_1 \rho \Leftrightarrow$$

$$a_0 = \rho (-a_n \rho^{n-1} - a_{n-1} \rho^{n-2} - \dots - a_1).$$

Επειδή οι  $\rho, a_1, a_2, \dots, a_n$  είναι ακέραιοι έπεται ότι και ο  $-a_n \rho^{n-1} - a_{n-1} \rho^{n-2} - \dots - a_1$  είναι ακέραιος.

Από την τελευταία ισότητα προκύπτει ότι ο  $\rho$  είναι διαιρέτης του  $a_0$ .

**A.2.** Η σωστή απάντηση είναι η δ.

**B.1.**  $\alpha \rightarrow \Lambda, \beta \rightarrow \Lambda, \gamma \rightarrow \Sigma$

**B.2.** Η σωστή απάντηση είναι η α.

## Ζήτημα 2ο

Για τη γωνία  $\alpha$  ισχύει ότι

$$5 \sin 2\alpha - 14 \sin \alpha - 7 = 0.$$

**α.** Να δείξετε ότι  $\sin \alpha = -3/5$

Μονάδες 10

**β.** Αν επιπλέον ισχύει  $\pi \leq \alpha \leq 3\pi/2$ , να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς  $\eta\mu 2\alpha$ ,  $\sin 2\alpha$  και  $\epsilon\phi 2\alpha$ .

Μονάδες 15

### Απάντηση:

**α.** Η δοσμένη σχέση γράφεται ισοδύναμα:

$$\begin{aligned} 5 \cdot (2 \sin^2 \alpha - 1) - 14 \sin \alpha - 7 &= 0 \Leftrightarrow \\ 10 \sin^2 \alpha - 5 - 14 \sin \alpha - 7 &= 0 \Leftrightarrow \\ 10 \sin^2 \alpha - 14 \sin \alpha - 12 &= 0 \Leftrightarrow \\ 5 \sin^2 \alpha - 7 \sin \alpha - 6 &= 0 \end{aligned}$$

Θέτουμε  $\sin \alpha = \psi$  με  $\psi \in [-1, 1]$  κι έχουμε:

$$5\psi^2 - 7\psi - 6 = 0$$

Είναι:

$$\Delta = 49 + 120 = 169 > 0$$

Οπότε:

- $\psi_1 = \frac{7 - \sqrt{169}}{10} = \frac{7 - 13}{10} = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5}$  δεκτή, αφού  $-\frac{3}{5} \in [-1, 1]$
- $\psi_2 = \frac{7 + \sqrt{169}}{10} = \frac{7 + 13}{10} = \frac{20}{10} = 2$  απορρίπτεται., αφού  $2 \notin [-1, 1]$

$$\text{Άρα: } \sin \alpha = -3/5$$

**β.** Από την βασική ταυτότητα:

$$\eta\mu^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1, \quad \text{με } \sin \alpha = -3/5$$

έχουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu^2 \alpha + \left(-\frac{3}{5}\right)^2 &= 1 \Leftrightarrow \\ \eta\mu^2 \alpha &= 1 - \frac{9}{25} \Leftrightarrow \\ \eta\mu^2 \alpha &= \frac{16}{25} \Leftrightarrow \\ \eta\mu \alpha &= \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Επειδή  $\pi \leq \alpha \leq 3\pi/2$ , είναι  $\eta\mu \alpha \leq 0$ , οπότε:

$$\eta\mu \alpha = -4/5$$

Είναι:

- $\eta\mu 2\alpha = 2 \eta\mu \alpha \sigma\upsilon\nu \alpha = 2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{24}{25}$
- $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2 \sigma\upsilon\nu^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = 2 \cdot \frac{9}{25} - 1 = \frac{18}{25} - 1 = -\frac{7}{25}$
- $\epsilon\varphi 2\alpha = \frac{\eta\mu 2\alpha}{\sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \frac{24/25}{-7/25} = -\frac{24}{7}$

### Ζήτημα 3ο

Ο τρίτος όρος μιας αριθμητικής προόδου ( $a_n$ ) είναι ίσος με  $a_3 = \log 125$  και η διαφορά της είναι ίση με  $\omega = \log 5$ .

**α.** Να δείξετε ότι ο πρώτος όρος  $a_1$  της προόδου είναι ίσος με τη διαφορά  $\omega$ .

Μονάδες 8

**β.** Να υπολογίσετε το άθροισμα  $A = a_{21} + a_{22} + \dots + a_{29}$ .

Μονάδες 8

**γ.** Έστω ( $\beta_n$ ) μία γεωμετρική πρόοδος με  $\beta_1 = a_1$  και  $\beta_2 = a_2$ , όπου  $a_1$  και  $a_2$  ο πρώτος και ο δεύτερος όρος της παραπάνω αριθμητικής προόδου αντίστοιχα. Να υπολογίσετε το άθροισμα  $B = \beta_1 + \beta_3 + \beta_5 + \dots + \beta_{1999} + \beta_{2001}$ .

Μονάδες 9

### Απάντηση:

**α.** Είναι:  $a_3 = \log 125 = \log 5^3 = 3 \log 5$ .

Επειδή η πρόοδος είναι αριθμητική με διαφορά  $\omega$ , έχουμε ότι:

$$a_3 = a_1 + 2\omega \Leftrightarrow$$

$$a_1 = a_3 - 2\omega.$$

Άρα:

$$a_1 = 3 \log 5 - 2 \log 5 = \log 5.$$

**β.** Επειδή είναι :

$a_1 = \log 5$  και  $\omega = \log 5$ , προκύπτει ότι:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \omega =$$

$$= \log 5 + (n - 1) \log 5 =$$

$$= \log 5 + n \log 5 - \log 5 =$$

$$= n \log 5.$$

Επομένως:

$$\begin{aligned} A &= a_{21} + a_{22} + \dots + a_{29} = \\ &= 21 \log 5 + 22 \log 5 + \dots + 29 \log 5 = \\ &= (21 + 22 + \dots + 29) \log 5. \end{aligned}$$

Όμως το άθροισμα  $21 + 22 + \dots + 29$  είναι άθροισμα διαδοχικών όρων αριθμ. προόδου με πρώτο όρο το 21, διαφορά 1 και πλήθος όρων 9. Οπότε

$$21 + 22 + \dots + 29 = \frac{[2 \cdot 21 + (9-1) \cdot 1] \cdot 9}{2} = \frac{(42+8) \cdot 9}{2} = \frac{50 \cdot 9}{2} = 25 \cdot 9 = 225$$

Άρα:

$$A = 225 \log 5.$$

**γ.** Επειδή η πρόδος ( $\beta_v$ ) είναι γεωμετρική, ο λόγος της θα είναι:

$$\lambda = \frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{2 \log 5}{\log 5} = 2$$

οπότε:

$$\beta_v = \beta_1 \cdot \lambda^{v-1} = \log 5 \cdot 2^{v-1} = 2^{v-1} \cdot \log 5$$

Άρα

$$\begin{aligned} B &= \beta_1 + \beta_3 + \beta_5 + \dots + \beta_{1999} + \beta_{2001} = \\ &= \log 5 + 2^2 \log 5 + 2^4 \log 5 + \dots + 2^{1998} \log 5 + 2^{2000} \log 5 = \\ &= (1 + 2^2 + 2^4 + \dots + 2^{1998} + 2^{2000}) \log 5. \end{aligned}$$

Όμως το άθροισμα

$$\begin{aligned} &1 + 2^2 + 2^4 + \dots + 2^{1998} + 2^{2000} = \\ &1 + (2^2 + 2^4 + \dots + 2^{1998} + 2^{2000}) = \\ &1 + [2^{2 \cdot 1} + 2^{2 \cdot 2} + \dots + 2^{2 \cdot 999} + 2^{2 \cdot 1000}] = \\ &1 + [(2^2)^1 + (2^2)^2 + \dots + (2^2)^{999} + (2^2)^{1000}] = \\ &= 1 + (4^1 + 4^2 + \dots + 4^{999} + 4^{1000}) = \\ &= 1 + \frac{4(4^{1000} - 1)}{4 - 1} = 1 + \frac{4}{3}(4^{1000} - 1) = 1 + \frac{4^{1001}}{3} - \frac{4}{3} = \\ &= \frac{1}{3}4^{1001} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}(4^{1001} - 1) \end{aligned}$$

Άρα:

$$B = \frac{1}{3}(4^{1001} - 1) \log 5$$

## Ζήτημα 4ο

Έστω  $Q(t)$  η τιμή ενός προϊόντος (σε εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές),  $t$  έτη μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Η αρχική τιμή του προϊόντος ήταν 300.000 δραχμές, ενώ μετά από 6 μήνες η τιμή του είχε μειωθεί στο μισό της αρχικής του τιμής. Αν είναι γνωστό ότι ισχύει

$$\ln Q(t) = at + \beta, \quad t \geq 0$$

όπου  $a, \beta \in \mathfrak{R}$ , τότε:

**α.** να δείξετε ότι  $Q(t) = 3 \cdot 4^{-t}$  για  $t \geq 0$

Μονάδες 10

**β.** να βρείτε σε πόσο χρόνο η τιμή του προϊόντος θα γίνει ίση με  $1/16$  της αρχικής του τιμής,

Μονάδες 8

**γ.** να βρείτε τον ελάχιστο χρόνο για τον οποίο η τιμή του προϊόντος δεν υπερβαίνει το  $1/9$  της αρχικής του τιμής.

Μονάδες 7

### Απάντηση:

**α.** Όταν ο χρόνος είναι  $t = 0$ , τότε η αρχική τιμή θα είναι  $Q(0) = 3$ , οπότε:

$$\ln Q(0) = a \cdot 0 + \beta = \beta$$

Άρα:

$$\beta = \ln 3 \quad (1)$$

Μετά από 6 μήνες (δηλαδή μετά από μισό έτος,  $t=1/2$ ) η τιμή του προϊόντος θα είναι:

$$Q\left(\frac{1}{2}\right) = 1,5 = \frac{3}{2}$$

οπότε:

$$\ln Q\left(\frac{1}{2}\right) = a \cdot \frac{1}{2} + \ln 3$$

Επομένως:

$$\ln \frac{3}{2} = \frac{1}{2} a + \ln 3 \Leftrightarrow$$

$$\ln 3 - \ln 2 = \frac{1}{2} a + \ln 3 \Leftrightarrow$$

$$-\ln 2 = \frac{1}{2} a \Leftrightarrow$$

$$a = -2 \ln 2 \Leftrightarrow$$

$$a = \ln(2^{-2}) \quad (2)$$

Από την σχέση  $\ln Q(t) = a t + \beta$  λόγω των σχέσεων (1) και (2) έχουμε:

$$\ln Q(t) = t \cdot \ln 2^{-2} + \ln 3 \Leftrightarrow$$

$$\ln Q(t) = \ln 2^{-2t} + \ln 3 \Leftrightarrow$$

$$\ln Q(t) = \ln 3 \cdot 2^{-2t} \Leftrightarrow$$

$$\ln Q(t) = \ln 3 \cdot 4^{-t}$$

Άρα:

$$Q(t) = 3 \cdot 4^{-t}$$

**β.** Αν είναι:

$$Q(t) = \frac{1}{16} Q(0) = \frac{1}{16} \cdot 3$$

τότε σύμφωνα με τον προηγούμενο τύπο έχουμε:

$$\frac{3}{16} = 3 \cdot 4^{-t} \Leftrightarrow \frac{1}{16} = 4^{-t} \Leftrightarrow 4^{-2} = 4^{-t}$$

Άρα:

$$t = 2 \text{ \u0395\u03c4\u0397.}$$

**γ.** Πρέπει:

$$Q(t) \leq \frac{1}{9} \cdot Q(0) \Leftrightarrow Q(t) \leq \frac{1}{9} \cdot 3 \Leftrightarrow$$

$$3 \cdot 4^{-t} \leq \frac{3}{9} \Leftrightarrow 3 \cdot 4^{-t} \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow$$

$$4^{-t} \leq \frac{1}{9} \Leftrightarrow 4^{-t} \leq 3^{-2} \Leftrightarrow$$

$$\frac{1}{4^t} \leq \frac{1}{3^2} \Leftrightarrow 4^t \geq 3^2$$

(  $4^t > 0$  για κάθε  $t \geq 0$  και  $3^2 > 0$  )

Επειδή  $4^t > 0$  για κάθε  $t \geq 0$  και  $3^2 > 0$ , λογαριθμίζουμε την τελευταία και βρίσκουμε:

$$\ln 4^t \geq \ln 3^2 \Leftrightarrow t \ln 4 \geq 2 \cdot \ln 3 \Leftrightarrow$$

$$t \geq \frac{2 \ln 3}{\ln 4} \Leftrightarrow t \geq \frac{2 \ln 3}{2 \ln 2} \Leftrightarrow$$

$$t \geq \frac{\ln 3}{\ln 2}$$

Άρα:

$$t = \frac{\ln 3}{\ln 2} \text{ \u0395\u03c4\u0397.}$$