



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
70<sup>ος</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
“Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Α' Λυκείου

**Πρόβλημα 1**

- (i) Να βρείτε τις τιμές του ρητού αριθμού  $\alpha$ , για τις οποίες ο αριθμός  $A = \alpha\sqrt{3}$  είναι ρητός.  
(ii) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός  $B = (1 + \sqrt{3})^2$  είναι άρρητος.

**Λύση**

(i) Για  $\alpha = 0$  είναι  $A = 0$ , ρητός. Έστω  $\alpha \neq 0$ . Αν ήταν ο  $A = \alpha\sqrt{3}$  ρητός, τότε ο αριθμός  $\frac{A}{\alpha} = \sqrt{3}$ , θα ήταν επίσης ρητός, ως πηλίκο δύο ρητών αριθμών, που είναι άτοπο.

Επομένως, ο αριθμός  $A$  είναι ρητός μόνο για  $\alpha = 0$ .

(ii) Έχουμε  $B = (1 + \sqrt{3})^2 = 4 + 2\sqrt{3}$ . Αν ο αριθμός  $B$  ήταν ρητός, τότε ο αριθμός  $B - 4 = 2\sqrt{3}$  θα ήταν επίσης ρητός, ως διαφορά δύο ρητών, το οποίο είναι άτοπο, σύμφωνα με το (i).

**Πρόβλημα 2**

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση

$$x + 1 - 2|x| = \alpha x,$$

έχει, για κάθε τιμή της παραμέτρου  $\alpha \in \mathbb{R}$ , μία τουλάχιστον πραγματική λύση.

Για ποιες τιμές του  $\alpha$  η εξίσωση έχει δύο διαφορετικές μεταξύ τους πραγματικές λύσεις;

**Λύση**

Επειδή στην εξίσωση εμφανίζεται η απόλυτη τιμή του αγνώστου  $x$  διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

(i) Έστω  $x \geq 0$ .

Τότε ισχύει  $|x| = x$  και η δεδομένη εξίσωση είναι ισοδύναμη με το σύστημα:

$$x + 1 - 2x = \alpha x, x \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha + 1)x = 1, x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\alpha + 1}, & \text{αν } \alpha > -1 \\ \text{αδύνατο,} & \text{αν } \alpha \leq -1. \end{cases}$$

(ii) Έστω  $x < 0$ .

Τότε ισχύει  $|x| = -x$  και η δεδομένη εξίσωση είναι ισοδύναμη με το σύστημα:

$$x + 1 + 2x = \alpha x, x < 0 \Leftrightarrow (\alpha - 3)x = 1, x < 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\alpha - 3}, & \text{αν } \alpha < 3 \\ \text{αδύνατο,} & \text{αν } \alpha \geq 3. \end{cases}$$

Επομένως, για κάθε τιμή της παραμέτρου  $\alpha \in \mathbb{R}$ , η εξίσωση έχει μία τουλάχιστον πραγματική λύση. Η εξίσωση έχει 2 πραγματικές λύσεις διαφορετικές μεταξύ τους, αν ισχύει:  $-1 < \alpha < 3$ .

Πράγματι, για  $-1 < \alpha < 3$  η εξίσωση έχει τις λύσεις  $x_1 = \frac{1}{\alpha - 3} < 0$  και  $x_2 = \frac{1}{\alpha + 1} > 0$  που είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

### Πρόβλημα 3

Δίνεται τρίγωνο  $ABC$  εγγεγραμμένο σε κύκλο  $C(O, R)$  και έστω  $A_1, B_1, C_1$  τα αντιδιαμετρικά σημεία των κορυφών του  $A, B, C$ . Στις ευθείες που ορίζουν οι πλευρές  $BC, AC, AB$  θεωρούμε τα σημεία  $A_2, B_2, C_2$  αντίστοιχα και έστω  $(\varepsilon_1)$  η ευθεία που ορίζουν τα σημεία  $A, A_2$ ,  $(\varepsilon_2)$  η ευθεία που ορίζουν τα σημεία  $B, B_2$  και  $(\varepsilon_3)$  η ευθεία που ορίζουν τα σημεία  $C, C_2$ .

Έστω ακόμη  $(\delta_1)$  η παράλληλη ευθεία που φέρουμε από το σημείο  $A$  προς την  $(\varepsilon_1)$ ,  $(\delta_2)$  η παράλληλη ευθεία που φέρουμε από το σημείο  $B$  προς την  $(\varepsilon_2)$  και  $(\delta_3)$  η παράλληλη ευθεία που φέρουμε από το σημείο  $C$  προς την  $(\varepsilon_3)$ . Να αποδείξετε ότι οι ευθείες  $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$  και  $(\varepsilon_3)$  συντρέχουν (περνάνε από το ίδιο σημείο), αν, και μόνο αν, οι ευθείες  $(\delta_1), (\delta_2)$  και  $(\delta_3)$  συντρέχουν


### Λύση

Οι ευθείες  $(\varepsilon_1)$  και  $(\delta_1)$  είναι συμμετρικές ως προς το κέντρο  $O$  του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου  $ABC$ , αφού το  $O$  είναι μέσο της  $AA_1$ .

Οι ευθείες  $(\varepsilon_2)$  και  $(\delta_2)$  είναι συμμετρικές ως προς το κέντρο  $O$  του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου  $ABC$ , αφού το  $O$  είναι μέσο της  $BB_1$ .

Οι ευθείες  $(\varepsilon_3)$  και  $(\delta_3)$  είναι συμμετρικές ως προς το κέντρο  $O$  του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου  $ABC$ , αφού το  $O$  είναι μέσο της  $CC_1$ .

Σύμφωνα με τη θεωρία, αν περιστρέψουμε μία ευθεία κατά  $180^\circ$  γύρω από το κέντρο συμμετρίας, τότε αυτή θα συμπέσει με τη συμμετρική της ευθεία, ως προς κέντρο το σημείο  $O$ . Επομένως, οι ευθείες  $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$  και  $(\varepsilon_3)$  συντρέχουν, έστω στο σημείο  $K$ , αν, και μόνο αν, οι ευθείες  $(\delta_1), (\delta_2)$  και  $(\delta_3)$  συντρέχουν στο σημείο  $K'$ , που είναι το συμμετρικό του σημείου  $K$  ως προς το σημείο  $O$ .



Σχήμα 3

### Παρατήρηση

Το σημείο  $K$  ταυτίζεται με το ορθόκεντρο του τριγώνου  $ABC$ , αν, και μόνο αν, τα σημεία  $A_2, B_2, C_2$  είναι τα μέσα των πλευρών  $BC, AC, AB$  αντίστοιχα.

Στη περίπτωση αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνωστή πρόταση:

“Τα συμμετρικά του ορθοκέντρου ως προς τα μέσα των πλευρών τριγώνου, βρίσκονται επάνω στο περιγεγραμμένο του κύκλο και είναι αντιδιαμετρικά των κορυφών του”

### Πρόβλημα 4

Οι πραγματικοί αριθμοί  $x, y$  και  $z$  ικανοποιούν τις ισότητες:

$$x^3 - y^3 = 26z^3$$

$$x^2y - xy^2 = 6z^3.$$

(α) Να εκφράσετε τους  $x, y$  συναρτήσει του  $z$ .

(β) Αν επιπλέον ισχύει ότι  $x + 2y + 3z = 8$ , να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς  $x, y$  και  $z$ .

### Λύση

Πολλαπλασιάζουμε την δεύτερη ισότητα επί 3 και την αφαιρούμε από την πρώτη, οπότε λαμβάνουμε

$$(x - y)^3 = 8z^3 \Leftrightarrow x - y = 2z. \quad (1)$$

Τότε η δεύτερη ισότητα γίνεται:

$$2zxy = 6z^3, \quad (2)$$

οπότε διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

(i) Έστω  $z \neq 0$ .

Τότε η (2) είναι ισοδύναμη με την σχέση

$$xy = 3z^2, \quad (3)$$

Από τις (1) και (3), προκύπτει η σχέση

$$x(x - 2z) = 3z^2 \Leftrightarrow x^2 - 2zx - 3z^2 = 0 \Leftrightarrow x = 3z \text{ ή } x = -z,$$

οπότε θα είναι

$$x = 3z, y = z \text{ ή } x = -z, y = -3z.$$

(ii) Για  $z = 0$  οι δύο πρώτες εξισώσεις γίνονται:

$$\left\{ \begin{array}{l} (x-y)(x^2+xy+y^2) = 0 \\ xy(x-y) = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow x-y=0 \text{ ή } x=y=0,$$

οπότε προκύπτει ότι:

$$x = y, \text{ ανεξάρτητα από το } z.$$

(β) Για  $x = 3z, y = z$  η εξίσωση  $x + 2y + 3z = 8$  γίνεται  $8z = 8 \Leftrightarrow z = 1$ , οπότε έχουμε ότι  $(x, y, z) = (3, 1, 1)$ , ενώ για  $x = -z, y = -3z$ , η εξίσωση γίνεται  $-4z = 8 \Leftrightarrow z = -2$ , οπότε έχουμε ότι  $(x, y, z) = (2, 6, -2)$ .

Για  $z = 0$ , είναι  $x = y$ , οπότε από την εξίσωση  $x + 2y + 3z = 8$  προκύπτει ότι

$$(x, y, z) = \left( \frac{8}{3}, \frac{8}{3}, 0 \right).$$