



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
73<sup>ος</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
“Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Α΄ τάξη Λυκείου

**Πρόβλημα 1**

Να λύσετε στους πραγματικούς αριθμούς το σύστημα:

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{|x|+x}{2} \leq \frac{|x|+3+x^2}{4}, \quad x(x^2+4)(x^2-5x+4) = 0.$$

**Λύση**

Έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{|x|+x}{2} \leq \frac{|x|+3+x^2}{4} &\Leftrightarrow (x-1)^2 + 2(|x|+x) \leq |x|+3+x^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + 2|x| + 2x \leq |x| + 3 + x^2 \Leftrightarrow |x| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2. \end{aligned}$$

Επομένως η ανίσωση του συστήματος αληθεύει για  $x \in [-2, 2]$ .

Επιπλέον, έχουμε

$$x(x^2+4)(x^2-5x+4) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x^2+4 = 0 \text{ ή } x^2-5x+4 = 0.$$

Η εξίσωση  $x^2+4 = 0$  είναι αδύνατη στο  $\mathbb{R}$ , αφού  $x^2+4 > 0$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , ενώ η εξίσωση  $x^2-5x+4 = 0$  έχει διακρίνουσα  $\Delta = 9 > 0$  και ρίζες  $x = 1$  ή  $x = 4$ .

Επομένως η εξίσωση του συστήματος έχει τις ρίζες  $x = 0$  ή  $x = 1$  ή  $x = 4$

Επειδή  $4 \notin [-2, 2]$ , το σύστημα αληθεύει για  $x = 0$  ή  $x = 1$ .

**Πρόβλημα 2**

Να απλοποιήσετε τις κλασματικές παραστάσεις

$$A(x, y) = \frac{(x^2+y^2)(x^3-y^3)(x^3+y^3)}{(x^2-y^2)(x^4+y^4+x^2y^2)} \quad \text{και} \quad B(x, y) = \frac{4x^2+16y^2+16xy-25}{2x+4y+5},$$

κν  $y \neq \pm x$  και  $2x+4y+5 \neq 0$ , και να λύσετε την εξίσωση

$$A(x, y) = B(x, y).$$

**Λύση**

Λόγω των υποθέσεων  $y \neq \pm x$  και  $2x+4y+5 \neq 0$ , δεν μηδενίζονται οι παρανομαστές των δύο παραστάσεων, οπότε αυτές ορίζονται. Με πράξεις στον παρανομαστή και στον αριθμητή της παράστασης  $A(x, y)$  λαμβάνουμε:

$$A(x, y) = \frac{(x^2+y^2)(x^3-y^3)(x^3+y^3)}{(x^2-y^2)(x^4+y^4+x^2y^2)} = \frac{(x^2+y^2)(x^6-y^6)}{x^6-y^6} = x^2+y^2.$$

Η απλοποίηση μπορεί επίσης να γίνει με χρήση της παραγοντοποίησης

$$x^6-y^6 = (x^2)^3 - (y^2)^3 = (x^2-y^2)(x^4+x^2y^2+y^4)$$

ή των παραγοντοποιήσεων

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2), \quad x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$x^4 + y^4 + x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2 = (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy).$$

Έχουμε επίσης

$$\begin{aligned} B(x, y) &= \frac{4x^2 + 16y^2 + 16xy - 25}{2x + 4y + 5} = \frac{(2x + 4y)^2 - 5^2}{2x + 4y + 5} \\ &= \frac{(2x + 4y + 5)(2x + 4y - 5)}{2x + 4y + 5} = 2x + 4y - 5. \end{aligned}$$

Επομένως η εξίσωση  $A(x, y) = B(x, y)$  γίνεται:

$$x^2 + y^2 = 2x + 4y - 5 \Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 - 4y + 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x - 1 = 0 \text{ και } y - 2 = 0 \text{ (διαφορετικά θα είχαμε } (x - 1)^2 + (y - 2)^2 > 0)$$

$$\Leftrightarrow x = 1, y = 2.$$


### Πρόβλημα 3

Δίνεται οξυγώνιο σκαληνό τρίγωνο  $AB\Gamma$  και σημεία  $\Delta, E$  των πλευρών του  $AG, AB$  αντίστοιχα, ώστε  $AD = AE$ . Οι κύκλοι  $c_1(B, BE)$  και  $c_2(\Gamma, \Gamma\Delta)$  τέμνουν την ευθεία  $B\Gamma$  στα σημεία  $B_1, B_2$  και  $\Gamma_1, \Gamma_2$ , αντίστοιχα. Το σημείο  $B_1$  βρίσκεται εκτός του τμήματος  $B\Gamma$  προς το μέρος του  $B$  και το σημείο  $\Gamma_2$  βρίσκεται εκτός του τμήματος  $B\Gamma$  προς το μέρος του  $\Gamma$ .

Να αποδείξετε ότι:

- (α) Τα σημεία  $E, B_2, \Gamma_1, \Delta$  βρίσκονται επάνω σε κύκλο, έστω  $c_3$ .
- (β) Τα σημεία  $E, B_1, \Gamma_2, \Delta$  βρίσκονται επάνω σε κύκλο, έστω  $c_4$ .
- (γ) Το σημείο  $A$  και τα κέντρα των κύκλων  $c_3$  και  $c_4$ , βρίσκονται επάνω στην ίδια ευθεία.

Λύση



(α) Το τρίγωνο  $BEB_2$  είναι ισοσκελές (οι πλευρές  $BE$  και  $BB_2$  είναι ακτίνες του κύκλου  $c_1$ ), οπότε η μεσοκάθετη της πλευράς  $EB_2$  είναι διχοτόμος της γωνίας  $\hat{B}$  και κατά συνέπεια θα διέρχεται από το έκκεντρο  $I$  του τριγώνου  $AB\Gamma$ . Επιπλέον ισχύει:

$$IE = IB_2 \quad (1).$$

Το τρίγωνο  $\Gamma\Delta\Gamma_1$  είναι ισοσκελές (οι πλευρές  $\Gamma\Delta$  και  $\Gamma\Gamma_1$  είναι ακτίνες του κύκλου  $c_2$ ), οπότε η μεσοκάθετη της πλευράς  $\Delta\Gamma_1$  είναι διχοτόμος της γωνίας  $\hat{\Gamma}$  και κατά συνέπεια θα διέρχεται από το έγκεντρο  $I$  του τριγώνου  $AB\Gamma$ . Επιπλέον ισχύει:

$$I\Delta = I\Gamma_1 \quad (2).$$

Το τρίγωνο  $AE\Delta$  είναι ισοσκελές (διότι  $A\Delta = AE$ ), άρα η μεσοκάθετη της πλευράς  $E\Delta$  είναι διχοτόμος της γωνίας  $\hat{A}$  και κατά συνέπεια θα διέρχεται από το έγκεντρο  $I$  του τριγώνου  $AB\Gamma$ . Επιπλέον ισχύει:

$$I\Delta = IE \quad (3).$$

Επομένως, οι μεσοκάθετες των τμημάτων  $B_2E$ ,  $E\Delta$ ,  $\Delta\Gamma_1$  περνάνε από το έγκεντρο  $I$  του τριγώνου  $AB\Gamma$ , οπότε (σε συνδυασμό με τις ιδιότητες (1), (2), (3)) συμπεραίνουμε ότι

$$I\Delta = IE = IB_2 = I\Gamma_1 := r,$$

δηλαδή τα σημεία  $E$ ,  $B_2$ ,  $\Gamma_1$ ,  $\Delta$  βρίσκονται επάνω σε κύκλο  $c_3$  με κέντρο το  $I$  και ακτίνα  $r$ .

(β) Με ανάλογο τρόπο αποδεικνύουμε ότι τα σημεία  $E$ ,  $B_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Delta$  βρίσκονται επάνω σε κύκλο  $c_4$  με κέντρο το παράκεντρο  $I_a$  του τριγώνου  $AB\Gamma$  και ακτίνα  $r_a := I_a\Delta = I_aE = I_a\Gamma_2 = I_aB_1$ .

(γ) Τα κέντρα των παραπάνω κύκλων ( $c_3$  και  $c_4$ ) βρίσκονται επάνω στη διχοτόμο της γωνίας  $\hat{A}$ , οπότε θα είναι συνευθειακά με τη κορυφή  $A$ .

#### Πρόβλημα 4

Δίνεται η εξίσωση

$$a^2x^2 + 2a(\sqrt{2}-1)x + \sqrt{x-2} + 3 - 2\sqrt{2} = 0,$$

όπου  $x \in \mathbb{R}$  άγνωστος και  $a \in \mathbb{R}$  παράμετρος. Να λύσετε την εξίσωση για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου  $a$ .

#### Λύση

Για να ορίζεται η  $\sqrt{x-2}$  πρέπει να είναι  $x \geq 2$ .

Η εξίσωση γράφεται στην ισοδύναμη μορφή

$$a^2x^2 + 2a(\sqrt{2}-1)x + 3 - 2\sqrt{2} = -\sqrt{x-2}, \quad x \geq 2. \quad (1)$$

Για  $a = 0$  έχουμε την εξίσωση

$$3 - 2\sqrt{2} = -\sqrt{x-2}, \quad x \geq 2, \quad (\text{αδύνατη, αφού } 3 - 2\sqrt{2} > 0).$$

Για  $a \neq 0$ , το πρώτο μέλος της (1) είναι τριώνυμο με διακρίνουσα  $\Delta = 0$ , οπότε η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα ως

$$(ax + \sqrt{2} - 1)^2 = -\sqrt{x-2}, \quad x \geq 2. \quad (2)$$

Επειδή είναι  $(ax + \sqrt{2} - 1)^2 \geq 0$  και  $-\sqrt{x-2} \leq 0$ ,  $x \geq 2$ , έπεται ότι η εξίσωση (2) έχει λύση,

αν, και μόνον αν,  $ax + \sqrt{2} - 1 = 0$  και  $x - 2 = 0$ ,  $x \geq 2 \Leftrightarrow x = 2$ , εφόσον  $a = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$ .

Επομένως, η δεδομένη εξίσωση έχει μόνο για  $a = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$  τη λύση  $x = 2$ .