ΤΑΞΗ: **Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ**
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: **ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ**
ΜΑΘΗΜΑ: **ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ**

Ημερομηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016
Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Σχολικό βιβλίο σελ. 45.

Α2. **α)** Λάθος
β) Σωστό
γ) Λάθος
δ) Σωστό
ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Β

Β1. $\vec{v} = 3\vec{a} - 2\vec{\beta} = 3(-1,2) - 2(0,-3) = (-3,6) + (0,6) = (-3,12).$

$\gamma = (-3,12)(-1,2) + 4(-1,2)(0,-3) = (3+24) + 4(0-6) = 27 - 24 = 3$.

Β2. $\text{AB} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \lambda_{\overline{\text{AB}}} \cdot \lambda_{\vec{v}} = -1 \Leftrightarrow \lambda_{\overline{\text{AB}}} = \dfrac{-1}{\lambda_{\vec{v}}} = \dfrac{-1}{\frac{12}{-3}} = \dfrac{1}{4}$

Άρα $\text{AB}: y - 3 = \dfrac{1}{4}(x-3) \Leftrightarrow 4y - 12 = x - 3 \Leftrightarrow x - 4y + 9 = 0$

και $\text{ΒΓ}: y = 3x - 2$ αφού $\gamma = \vec{v}\vec{a} + 4\vec{a}\vec{\beta} = 3$

Για την εύρεση της κορυφής Β λύνω το σύστημα:

$$\begin{pmatrix} x - 4y = -9 \\ y = 3x - 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x - 12x + 8 = -9 \\ y = 3x - 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \left(-11x = -17\right) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x = \dfrac{17}{11} \\ y = \dfrac{29}{11} \end{pmatrix}$$

Β3. $\begin{pmatrix} x_M = \lambda - 1 \\ y_M = 2\lambda + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda = x_M + 1 \\ y_M = 2x_M + 2 + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda = x_M + 1 \\ 2x_M - y_M + 4 = 0 \end{pmatrix}$

Άρα το Μ κινείται στην ευθεία 2χ-ψ+4=0

Β4. Είναι $\text{ΑΓ}: 2x - y + 4 = 0$.

$$(\text{ΒΛ}) = \text{d}\,(B,\ \text{ΑΓ}) = \frac{\left|2\cdot\frac{17}{11} - \frac{29}{11} + 4\right|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{\frac{49}{11}}{\sqrt{5}} = \frac{49\sqrt{5}}{11\cdot 5} = \frac{49\sqrt{5}}{55}.$$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η $(\varepsilon): x + y = 0$ **δεν** διέρχεται από το Α(2, –3) αφού οι συντεταγμένες του δεν την επαληθεύουν και δεν είναι παράλληλη στην ΔΓ γιατί $\lambda_\varepsilon = -1 \neq \lambda_{\Delta\Gamma}$. Άρα είναι η (ΒΓ).



Για το Γ λύνουμε το

$$(\Sigma_1)\ \begin{Bmatrix} x + y = 0 \\ 2x - 3y + 5 = 0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} y = -x \\ 2x + 3x + 5 = 0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} y = 1 \\ x = -1 \end{Bmatrix}$$

δηλαδή Γ (–1, 1), άρα $K\left(\frac{-1+2}{2}, \frac{1-3}{2}\right)$ ή $K\left(\frac{1}{2}, -1\right)$.

Γ2. Για την ΑΒ: $(\Delta\Gamma)//(\text{AB}) \Leftrightarrow \lambda_{\Gamma\Delta} = \lambda_{\text{AB}} = \frac{2}{3}$ και διέρχεται από το Α(2,–3)

άρα $y - (-3) = \frac{2}{3}(x - 2) \Leftrightarrow\ 2x - 3y - 13 = 0$.

Για το σημείο Β:

$$(\Sigma_2)\ \begin{Bmatrix} 2x - 3y - 13 = 0 \\ x + y = 0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} 2x + 3x = 13 \\ y = -x \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} x = \frac{13}{5} \\ y = \frac{-13}{5} \end{Bmatrix}$$ Άρα $B\left(\frac{13}{5}, \frac{-13}{5}\right)$

δηλ. $\overrightarrow{\text{ΑΓ}} = (-3, 4)$ και $\overrightarrow{\text{ΑΒ}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right)$

δηλ. $$(\text{ΑΒΓ}) = \frac{1}{2}\left\|\begin{matrix} -3 & 4 \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{matrix}\right\| = \frac{1}{2}\cdot\left|-\frac{6}{5} - \frac{12}{5}\right| = \frac{9}{5}\ \text{τ.μ.}$$

άρα $(\text{ΑΒΓΔ}) = 2(\text{ΑΒΓ}) = \frac{18}{5}$ τ.μ.

Γ3. Η παραβολή είναι της μορφής

$C: y^2 = 2px$ και διέρχεται από το σημείο $\mathrm{K}\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ άρα:

$1 = 2p \cdot \frac{1}{2} \Leftrightarrow p = 1$ δηλαδή $\mathrm{C}: y^2 = 2x \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}y^2$.

Γ4. Η εφαπτόμενη στο σημείο $\mathrm{K}\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ θα είναι:

$(\eta): -y = 1 \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow 2x + 2y + 1 = 0$ με $\lambda_\varepsilon = -1$

Η διχοτόμος της γωνίας ΕΚΘ είναι κάθετη στην παραπάνω εφαπτόμενη

$\delta \perp \eta \Leftrightarrow \lambda_\delta \cdot \lambda_\eta = -1 \Leftrightarrow \lambda_\delta = 1$ (από την ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής)

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η εξίσωση $(\varepsilon): \alpha x + \beta y = 0$ παριστάνει ευθεία, άρα $a \neq 0$ ή $\beta \neq 0$.

Η εξίσωση $x^2 + y^2 - 4ax - 4\beta y = 0$ **(1)** είναι της μορφής $x^2 + y^2 + \mathrm{A}x + By + \Gamma = 0$

με: $\mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 - 4\Gamma = 16\alpha^2 + 16\beta^2 = 16(\alpha^2 + \beta^2) > 0$ αφού $a \neq 0$ ή $\beta \neq 0$.

Άρα παριστάνει κύκλο με κέντρο Κ(2α,2β) και ακτίνα

$\rho = \frac{\sqrt{16(a^2 + \beta^2)}}{2} = 2\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$

Δ2. $d(\mathrm{K}, \varepsilon) = \frac{|2\alpha^2 + 2\beta^2|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = 2\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \rho$ δηλαδή η ευθεία είναι εφαπτόμενη του κύκλου.

Δ3. Αν $\mathrm{K}(x_\kappa, y_\kappa)$ τότε: $\begin{cases} x_\kappa = 2\alpha \\ y_\kappa = 2\beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{x_\kappa}{2} \\ \beta = \frac{y_\kappa}{2} \end{cases}$.

Όμως $3a^2 + 4\beta^2 = 3 \Leftrightarrow 3\frac{x_\kappa^2}{4} + 4\frac{y_\kappa^2}{4} = 3 \Leftrightarrow$

$3x_\kappa^2 + 4y_\kappa^2 = 12$ ή $\frac{x_\kappa^2}{4} + \frac{y_\kappa^2}{3} = 1$

δηλαδή κινείται το Κ σε έλλειψη με $\alpha^2 = 4$ και $\beta^2 = 3$.

Άρα α = 2 και $\beta = \sqrt{3}$ οπότε θα είναι:

Μεγάλος άξονας: $(\mathrm{AA}') = 2a = 4$, μικρός άξονας: $(\mathrm{BB}') = 2\sqrt{3}$ και

$\gamma^2 = 4-3 = 1$ δηλαδή εκκεντρότητα $\varepsilon = \dfrac{\gamma}{\alpha} = \dfrac{1}{2}$.

Δ4. Η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο $N(x_1, y_1)$ είναι: $3x_1 \cdot x + 4y_1 \cdot y = 12$, η οποία διέρχεται από το Ζ(-2, 3) άρα:

$-6x_1 + 12y_1 = 12 \Leftrightarrow x_1 - 2y_1 = -2$ (1) και το $N(x_1, y_1)$ είναι σημείο της έλλειψης, οπότε: $3x_1^2 + 4y_1^2 = 12$ (2)

Για την εύρεση της $N(x_1, y_1)$ λύνω το σύστημα των (1) και (2):

$$(\Sigma)\ \left.\begin{array}{l} x_1 - 2y_1 = -2 \\ 3x_1^2 + 4y_1^2 = 12 \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_1 = 2y_1 - 2 \\ 3\cdot(2y_1-2)^2 + 4y_1^2 = 12 \end{array}\right\} \Leftrightarrow$$

$$\cancel{12}\left(y_1^2 - 2y_1 + 1\right) + 4y_1^2 = \cancel{12} \Leftrightarrow 3y_1^2 - 6y_1 + 3 + y_1^2 - 3 = 0$$

$4y_1^2 - 6y_1 = 0 \Leftrightarrow y_1 = 0$ ή $y_1 = \dfrac{3}{2}$ δηλαδή $N\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$. Άρα η εξίσωση της εφαπτόμενης

είναι $3\cdot 1\cdot x + 4\cdot\dfrac{3}{2}\cdot y = 12 \Leftrightarrow 3x + 6y = 12 \Leftrightarrow x + 2y = 4 \Leftrightarrow x + 2y - 4 = 0$

Είναι $A'(-2,0)$, $N\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ οπότε το μέσο Μ του NA' είναι $M\left(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{4}\right)$.

Έχω και Ζ (–2, 3), Ο(0,0)

Άρα $\overrightarrow{OM} = \left(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{4}\right)$ και $\overrightarrow{OZ} = (-2, 3)$.

Οπότε $\det\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OZ}\right) = \begin{vmatrix} -\dfrac{1}{2} & \dfrac{3}{4} \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -\dfrac{3}{2} + \dfrac{6}{4} = -\dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{2} = 0$

Δηλαδή $\overrightarrow{OM} // \overrightarrow{OZ}$ οπότε Ο, Μ, Ζ συνευθειακά.