

# ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

## ΘΕΜΑ Α

A1 - γ, A2 - β, A3 - β, A4 - γ


- A5. α. Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών (n, l, m<sub>l</sub>, m<sub>s</sub>). Συνεπώς, δεν μπορεί ένα τροχιακό να χωρέσει πάνω από δύο ηλεκτρόνια (σχολικό βιβλίο, σελ. 13).
- β. Δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με το pH του διαλύματος στο οποίο προστίθενται. (σχολικό βιβλίο, σελ. 122).

## ΘΕΜΑ Β




Το  ${}_7N$  έχει τα περισσότερα μονήρη e<sup>-</sup>.

- β.  $NaNO_2 \rightarrow$  ιοντική ένωση  
γιατί το  ${}_{11}Na$  είναι μέταλλο (1e<sup>-</sup> σθένους, ανήκει στην I<sub>A</sub> ομάδα των αλκαλικών μετάλλων).



B2. Η πρόταση είναι σωστή





τα ηλεκτρόνια σθένους είναι έξι (6) και ανήκουν στα εξής τροχιακά  
(4, 0, 0) (4, 1, 0) (4, 1, +1) (4, 1, -1)

β. Η πρόταση είναι σωστή.

Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού ( $E_{1_1}$ ) κατά μήκος μιας περιόδου αυξάνεται προς τα δεξιά δηλαδή από τα στοιχεία με μικρότερο προς τα στοιχεία με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό, άρα τα τρία τελευταία στοιχεία μιας περιόδου μπορεί να έχουν τις σχετικά υψηλές τιμές  $E_{1_1}$  .1314, 1681, 2081 KJ/mol , ενώ το επόμενο στοιχείο που θα είναι το πρώτο της επόμενης περιόδου και θα ανήκει στην  $I_A$  ομάδα , θα έχει σχετικά μικρή  $E_{1_1}$  496 KJ/mol.



γ. Η πρόταση είναι λάθος.



συνολική  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,1 + x$  όπου  $x < 0,1 \text{ M}$ .

Άρα  $[\text{H}_3\text{O}^+] \neq 0,2 \text{ M}$ .





δ. Η πρόταση είναι λάθος γιατί έχουμε επίδραση κοινού ιόντος ( $\text{OH}^-$ ) και ο βαθμός ιοντισμού της βάσης Β θα ελαττωθεί



Λόγω της αρχής Le Chatelier η αύξηση της συγκέντρωσης των  $\text{OH}^-$  προκαλεί μετατόπιση της ισορροπίας προς τα αριστερά και έτσι μειώνεται το  $x$  και ο

βαθμός ιοντισμού  $\alpha = \frac{x}{C}$  άρα ο βαθμός ιοντισμού μειώνεται.

**B3.**



Με προσθήκη σε δείγμα από κάθε δοχείο αντιδραστηρίου Tollens ( $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ ) αντιδρά μόνο η βουτανάλη σχηματίζοντας κάτοπτρο Ag (ίζημα).

Σε δείγμα από τα υπόλοιπα τρία δοχεία με προσθήκη δ/τος  $\text{NaHCO}_3$  αντιδρά μόνο το βουτανικό οξύ σχηματίζοντας αέριο  $\text{CO}_2$  (έκλυση φυσαλίδων).

Σε δείγμα από τα υπόλοιπα δύο δοχεία  $\text{KMnO}_4/\text{H}^+$  αντιδρά μόνο η 2-βουτανόλη οξειδώνεται αποχρωματίζοντας το ερυθροϊώδες  $\text{KMnO}_4$ . Στο δοχείο που έμεινε, προσθήκη  $\text{I}_2/\text{NaOH}$  δίνει κίτρινο ίζημα  $\text{CHI}_3$  που πιστοποιεί την παρουσία της βουτανόλης.

### ΘΕΜΑ Γ

Γ1. i) A:  $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$  (η ένωση μπορεί να είναι οξύ ή εστέρας)

ii)  $\text{A} + \text{NaOH} \rightarrow \text{B} + \text{Γ}$   
Άρα η A είναι εστέρας και το B, Γ είναι αλκοόλη και οργανικό άλας οξέος.

iii)  $\text{Γ} + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \Delta + \dots$

iv)  $\Delta + \text{Cl}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{B} + \text{E} + \dots$   
Η αντίδραση (iv) είναι αλογονοφορμική άρα η ένωση Δ μπορεί να είναι

1) δευτεροταγής μεθυλοαλκοολή ή η  $\text{CH}_3-\text{CH}$

$\text{OH}$

2) μεθυλοκετόνη ή η  $\text{CH}_3-\text{CH}$

$\text{O}$

Η ένωση Δ και η Γ έχουν ίδιο αριθμό ανθράκων όμως η B που είναι το οργανικό άλας οξέος έχει έναν άνθρακα λιγότερο από την Γ.

Έτσι

B:  $\text{C}_\mu\text{H}_{2\mu-1}\text{O}_2\text{Na}$

Γ:  $\text{C}_\lambda\text{H}_{2\lambda+1}\text{OH}$



$$\left. \begin{array}{l} \lambda = \mu + 1 \\ \lambda + \mu = 5 \end{array} \right\} \mu + \mu + 1 = 5 \Rightarrow 2\mu = 4 \Rightarrow \mu = 2.$$


B:  $\text{CH}_3\text{COONa}$     A:  $\text{CH}_3\text{COO}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_3$

Γ:  $\text{CH}_3-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_3$


E:  $\text{CHCl}_3$     Δ:  $\text{CH}_3-\underset{\text{O}}{\text{C}}-\text{CH}_3$

Οι αντιδράσεις είναι:





- Γ2.** Η αιθανόλη είναι δυνατό να οξειδωθεί προς αλδεΐδη (αιθανάλη) ή οξύ (αιθανικό).  
Επειδή η ένωση Β εξουδετερώνεται από διάλυμα NaOH συμπεραίνουμε πως πρόκειται για το CH<sub>3</sub>COOH.  
Άρα η Α είναι CH<sub>3</sub>CH=O.



(mol)                    x                    y

Πλήρης εξουδετέρωση, άρα  $x = y = C_{\text{NaOH}} V_{\text{NaOH}} = 1 \cdot 0,2 = 0,2 \text{ mol}$ .




3 mol                    2 mol  
0,2 mol                    ω ;

3 mol  
0,2 mol


$$\omega = \frac{0,2 \cdot 2}{3} = \frac{0,4}{3} \text{ mol } \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$$

$$M_{r\text{Cu}_2\text{O}} = 2 \cdot 63,5 + 16 = 143 \quad \text{άρα} \quad n_{\text{Cu}_2\text{O}} = \frac{m}{M_r} = \frac{28,6}{143} = 0,2 \text{ mol}$$



1 mol  
φ ; = 0,2 mol

1 mol  
0,2 mol



3 mol                    1 mol  
0,2 mol                    λ ;

3 mol  
0,2 mol

$$\lambda = \frac{0,2}{3} \text{ mol.}$$


άρα για την οξείδωση της CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH απαιτήθηκαν συνολικά:

$$\frac{0,2}{3} + \frac{0,4}{3} = \frac{0,6}{3} = 0,2 \text{ mol } \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$$

$$C = \frac{n}{V} \Rightarrow V = \frac{n}{C} = \frac{0,2}{0,1} = 2 \text{ L.}$$

## ΘΕΜΑ Δ

Δ1.




Υπολογισμός mol

$$n_{HA} = C_{HA} \cdot V_1 = 0,1 \cdot 0,02 = 0,002 \text{ mol}$$

$$n_{NaOH} = C_{NaOH} \cdot V_2 = 0,1 \cdot 0,01 = 0,001 \text{ mol}$$



Κατά την αντίδραση πραγματοποιείται η αντίδραση εξουδετέρωσης:



Στο  $Y_3$  έχουμε:

$$[HA] = \frac{n_{HA}}{V_3} = \frac{0,001}{0,03} = \frac{1}{30} \text{ M}$$

$$[NaA] = \frac{n_{NaA}}{V_3} = \frac{0,001}{0,03} = \frac{1}{30} \text{ M}$$



$$K_{a(HA)} = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} = \frac{\left(\frac{1}{30} + x\right)x}{\frac{1}{30} - x}$$

Γίνονται οι σχετικές προσεγγίσεις

$$\frac{1}{30} + x \approx \frac{1}{30} \text{ M}$$


$$\frac{1}{30} - x \approx \frac{1}{30} \text{ M}$$

Επομένως προκύπτει:

$$K_{a_{HA}} = \frac{\frac{1}{30}x}{\frac{1}{30}} = x \quad \Rightarrow \quad K_{a_{HA}} = 10^{-4}$$

$$pH = 4 \Rightarrow -\log[H_3O^+] = 4 \quad \text{άρα} \quad [H_3O^+] = x = 10^{-4}$$

Δ2.




Υπολογισμός mol

$$Y_1 : n_{HA} = C_{HA} \cdot V_1 = 0,1 \cdot 0,018 = 18 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$Y_2 : n_{NaOH} = C_{NaOH} \cdot V_2 = 0,1 \cdot 0,022 = 22 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

Πραγματοποιείται η αντίδραση εξουδετέρωσης:




Στο τελικό διάλυμα  $V_4$  υπάρχουν:


$$[NaOH] = \frac{n_{NaOH}}{V_4} = \frac{4 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-2}} = 10^{-2} \text{ M}$$

$$[NaA] = \frac{n_{NaA}}{V_4} = \frac{18 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-2}} = 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ M}$$


Το NaA είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης και δίσταται σύμφωνα με την αντίδραση:



Τα ιόντα νατρίου προέρχονται από ισχυρό ηλεκτρολύτη και δεν αντιδρούν με το νερό ενώ τα ιόντα  $A^-$  αντιδρούν με το νερό επειδή προέρχονται από ασθενή ηλεκτρολύτη (HA) σύμφωνα με την αντίδραση:



Το NaOH είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης και δίσταται σύμφωνα με την αντίδραση:



Στο τελικό διάλυμα είναι:


$$[\text{OH}]_{\text{ολ}} = [\text{OH}]_{\text{NaOH}} + [\text{OH}]_{\text{ασθ}} \approx [\text{OH}]_{\text{NaOH}} = 10^{-2} \text{ M}$$

Το pH καθορίζεται από την ισχυρή βάση NaOH, λόγω ισχύος των σχετικών προσεγγίσεων

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log 10^{-2} = 2$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \Rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 12.$$

**Δ3.**




Υπολογισμός mol

$$Y_5: \quad n_{\text{HB}} \cdot Y_5 = 0,06 C \text{ mol}$$

$$Y_2: \quad n_{\text{NaOH}} = C_{\text{NaOH}} Y_2 = 0,002 \text{ ή } 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$


Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- i) Έστω ότι  $n_{\text{HB}} = n_{\text{NaOH}}$   
 Στην περίπτωση αυτή στο  $Y_6$  θα υπάρχει μόνο το άλας NaB:




Άρα  $\text{pH} > 7$ . Η περίπτωση αυτή είναι μη αποδεκτή.

- ii) Έστω ότι  $n_{\text{HB}} < n_{\text{NaOH}}$   
 Στην περίπτωση αυτή στο  $Y_6$  θα υπάρχει NaOH και NaB



Άρα  $\text{pH} > 7$ , επίσης μη αποδεκτή.



- iii) Επομένως αποδεκτή η πλήρης εξουδετέρωση του NaOH,  $n_{\text{HB}} > n_{\text{NaOH}}$



Στο  $Y_6$  υπολογίζουμε:

$$C_{\text{HB}} = \frac{n_{\text{HB}}}{V_6} = \frac{0,06 \cdot C - 2 \cdot 10^{-3}}{0,08} = \omega \text{ M}$$

$$C_{\text{NaB}} = \frac{n_{\text{NaB}}}{V_6} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{0,08} = 0,025 \text{ M}$$




$$\text{pH} = 4 \Rightarrow -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = 4 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = \varphi = 10^{-4} \text{ M}$$

Από τη σταθερά ιοντισμού του HB έχουμε:

$$K_a = \frac{[\text{B}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HB}]} = \frac{(0,025 + \varphi) \cdot \varphi}{\omega - \varphi}$$

Αποδεχόμενοι τις γνωστές προσεγγίσεις προκύπτει:

$$K_a = \frac{0,025 \cdot \varphi}{\omega} \Rightarrow K_a = \frac{2 \cdot 10^{-7}}{0,06C - 2 \cdot 10^{-3}} \quad (1)$$




Υπολογισμός mol:

$$Y_5: n_{\text{HB}} = C_{\text{HB}} \cdot V_5 = 0,06 \cdot C \text{ mol}$$

$$Y_2: n_{\text{NaOH}} = C_{\text{NaOH}} \cdot V_2 = 0,1 \cdot 0,05 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ανάμιξη του ίδιου ερωτήματος είναι:




Στο  $Y_7$  υπολογίζουμε:

$$C_{\text{HB}} = \frac{n_{\text{HB}}}{V_7} = \frac{0,06 \cdot C - 5 \cdot 10^{-3}}{0,11} = \gamma \text{ M}$$

$$C_{\text{NaB}} = \frac{n_{\text{NaB}}}{V_7} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,11} \text{ M}$$





$$pH = 5 \Rightarrow -\log[H_3O^+] = 5 \Rightarrow [H_3O^+] = \lambda = 10^{-5} \text{ M.}$$

Από τη σταθερά ιοντισμού του HB έχουμε:

$$K_a = \frac{[B^-][H_3O^+]}{[HB]} = \frac{\left(\lambda + \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,11}\right)\lambda}{\gamma - \lambda} \approx \frac{\frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,11} \cdot 10^{-5}}{0,06 \cdot C - 5 \cdot 10^{-3}} = K_a = \frac{5 \cdot 10^{-8}}{0,06 \cdot C - 5 \cdot 10^{-3}} \quad (2)$$

Επειδή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, η σταθερά  $K_a$  παραμένει σταθερή και από (1) και (2) έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{2 \cdot 10^{-7}}{0,06 \cdot C - 2 \cdot 10^{-3}} &= \frac{5 \cdot 10^{-8}}{0,06 \cdot C - 5 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \\ \Rightarrow 0,12 \cdot C - 10^{-2} &= 0,03 \cdot C - 10^{-3} \Rightarrow \\ \Rightarrow 0,09 \cdot C &= 0,009 \Rightarrow C = 0,1 \text{ M} \end{aligned}$$

Από την (1) προκύπτει:

$$K_a = \frac{2 \cdot 10^{-7}}{0,06 \cdot 0,1 - 2 \cdot 10^{-3}} = \frac{2 \cdot 10^{-7}}{4 \cdot 10^{-3}} = 5 \cdot 10^{-5}.$$

β) Στο ισοδύναμο σημείο ισχύει, σύμφωνα με την αντίδραση εξουδετέρωσης:

$$n_{HB} = n_{NaOH}$$

$$\text{Δηλαδή } n_{HB} = 0,06 \cdot 0,1 = 0,006 \text{ mol} = n_{NaOH}$$


$$\text{Οπότε για την ισχυρή βάση } V = \frac{n}{C} = \frac{0,006}{0,1} = 0,06$$


Άρα μετά την ανάμιξη  $0,06 \cdot 2 = 0,12 \text{ L.}$



0,006	0,006	-	-
-0,006	-0,006	0,006	-
-	-	0,006	-

$$NaB: C = \frac{0,006}{0,12} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ M}$$





$$K_{b_{B^-}} = \frac{K_w}{K_{a_{HB}}} = \frac{10^{-14}}{5 \cdot 10^{-5}} = 2 \cdot 10^{-10}$$

$$K_{b_{B^-}} = \frac{\mu^2}{5 \cdot 10^{-2}} = 2 \cdot 10^{-10} \Rightarrow \mu^2 = 10 \cdot 10^{-12} = 10^{-11}$$

$$\mu = [OH] = \sqrt{10^{-11}} = 10^{-5,5} \text{ M}$$

$$pOH = -\log 10^{-5,5} = 5,5$$

$$pH = 14 - 5,5 = 8,5$$

ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΝΤΗ